

¿Qué es el GBG?



¡Para prevenir, tu ayuda es importante!

El gusano barrenador del ganado es una plaga que ataca a animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano.

Una sola hembra de la mosca puede poner más de **300 huevos** en una pequeña herida o cavidad.

Entre 12 y 24 horas después, las larvas nacen y comienzan a alimentarse del tejido vivo del animal o ser humano.

El GBG representa una importante amenaza para la ganadería nacional, la vida silvestre y la salud pública.

Notifica para proteger a tus animales

Si encontramos GBG curamos a tu ganado, te ayudamos a salvarlo

☎ 800 751 2100
☎ 55 3996 4462
✉ gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C.

Carretera Juan Crispín-Chicoasén Km. 2.5
Col. Juan Crispín. SAGyP C.P. 29020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. 961 671 9349

Contacto: cfppchiapas@prodigy.net.mx
www.cfppchiapas.org
osiap.org.mx



Más información

Disponible en Google play

Disponible en el App Store



Si ves gusanos en heridas de tus animales puede ser **gusano barrenador del ganado (GBG)**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

PROCEDIMIENTO

PARA EL MANEJO DE HERIDAS
Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
DE LARVAS CON SOSPECHA A

GBG

[gusano barrenador del ganado]

Debe realizarse con el
animal inmovilizado.

 **Sigue las buenas prácticas de manejo**

Usa equipo de protección adecuado (guantes desechables y overol).


1. Limpia la herida

Retira pelo, costras y cualquier otra materia orgánica. Limpia con agua y jabón la herida con ayuda de gasas estériles.




2. Extrae preferentemente

10 larvas de lo más profundo de la herida (se sugiere utilizar pinzas quirúrgicas para mejor manejo de la muestra).



3. Introduce las larvas en un frasco o tubo

con alcohol al 70%.



4. Aplica el polvo curativo,

colócalo dentro y en el borde de la herida, esto facilitará la eliminación de las larvas.



5. En caso de obtener más larvas

después de aplicar medicamento, colócalas en el tubo con alcohol al 70% o en cal para que mueran.



6. Evita que las larvas

caigan al suelo, si se entierran pueden emerger nuevas moscas y recomenzar su ciclo biológico.



7. Notifica

a los teléfonos de **emergencia 800 751 2100** o mediante la **aplicación AVISE**. Atención gratuita las 24 horas los 365 días.

