

Tratamiento Timol

Para 1 colmena 

Material a utilizar:

1. Cristales de timol
2. Esponja verde (vermiculita)
3. Alcohol de caña potable
4. Vaso dosificador

Preparación:

1. Mezcla 8 g de cristales de timol en 8 ml de alcohol (esta solución rinde 16 ml)
2. Corta la esponja en cuadritos de 6x4x0.5 cm

Aplicación:

3. Aplica 8 ml de solución en cada cuadrito de esponja, coloca sobre los cabezales de los bastidores en la cámara de cría (2 cuadritos por colmena en 2 esquinas)

El tratamiento completo consta de 3 aplicaciones, una cada 8 días.



TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE

INFÓRMATE



Varroasis de las abejas

COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C.

Juan Crispín 2, Col. Juan Crispin, C.P. 29100
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Dentro de las instalaciones de la SAGyP
Tel. 961 671 93 49.
www.cfppchiapas.org
www.osiap.org.mx

Síguenos en nuestras Redes Sociales



@cfppchiapas

www.gob.mx/agricultura

www.gob.mx/senasica

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político
queda prohibido su uso para fines diferentes a los establecidos.



La varroasis es una enfermedad causada por el ácaro externo *Varroa destructor* que afecta a las abejas obreras, reinas y zánganos.



Provoca graves problemas en tus abejas, como:

- ☛ Deformación de alas y patas.
- ☛ Reducción hasta del 50% de su periodo de vida.
- ☛ Predisposición a otras enfermedades.
- ☛ Reducción hasta del 50% en su producción de miel.
- ☛ Evasión de abejas por alto grado de infestación.
- ☛ Pérdida de colmenas.

Para el control de esta parasitosis, existen tratamientos altamente efectivos y de bajo costo, ¡Utilízalos!



Tratamiento Ácido Fórmico

Para 1 colmena



42 ml de ácido fórmico + 18 ml de agua
Mezcla total: 60 ml

Material a utilizar:

- ☛ Algodón plisado de 10 x 15 cm
- ☛ 1 bolsa de plástico de 15 x 20 cm
- ☛ 1 jeringa de 20 o 30 ml
- ☛ 1 recipiente con tapa
- ☛ Guantes de latex o hule



Preparación:

1. Coloca el algodón en la bolsa y añade los 60 ml de la mezcla elaborada.
2. Sella la bolsa y coloca en un recipiente con tapa para llevarlo al apiario.

Aplicación:

3. En una cara de la bolsa, haz un corte cuadrado de 3x3 cm.
4. Coloca la bolsa encima de los bastidores de la cámara de cría, con la abertura hacia abajo, para libre evaporación.

Para aplicar en divisiones (de 1 a 6 panales), coloca la bolsa con la abertura hacia arriba, pegado o junto al panal de miel o básico, reduce a medida piquera.

Aplica 4 tratamientos en total, uno cada 4 días para mayor efectividad.

Tratamiento Ácido Oxálico

Para 40 colmenas



1L de agua + 1 Kg de azúcar
+ 100 g de ácido oxálico

Material a utilizar:

- ☛ Vaso dosificador
- ☛ 1 jeringa de 5 ml



Aplicación:

Mezcla los ingredientes y aplica 5 ml entre bastidor y bastidor (de acuerdo al número de bastidores).

Aplica 4 tratamientos en total, uno cada 4 días para mayor efectividad.

COLMENAS	ÁCIDO OXÁLICO (gramos)	AZÚCAR (gramos)	AGUA (ml)
1	2.5	25	25
2	5	50	50
3	7.5	75	75
4	10	100	100
5	12.5	125	125
6	15	150	150
7	17.5	175	175
8	20	200	200
9	22.5	225	225
10	25	250	250

Para evitar el agotamiento de las colmenas, proporciona alimento a las 48 horas (2 días), jarabe de azúcar en proporción 1 a 1.